

Preparandonos para la Vacuna COVID-19: Personas Sordas

¡Todo el que quiera una vacuna debería recibirla! Las vacunas COVID-19 son [seguras y efectivas](#).

Si usted es una de las pocas personas que contrae COVID-19 después de recibir la vacuna, tiene muchas menos posibilidades de:

- [Enfermarse gravemente](#)
- [Ir al hospital](#)

La vacuna puede tener efectos secundarios para muchas personas. Es posible que no experimente efectos secundarios o puede experimentar efectos secundarios durante unos días. Si tiene una vacuna de dos inyecciones, puede experimentar efectos secundarios después de una, ambas o ninguna de las inyecciones.

Estos [efectos secundarios](#) podrían incluir:

- Síntoma parecido a la gripe
- Cansancio
- Brazo adolorido
- Hinchazón
- Fiebre
- Dolor de Cabeza
- Náusea

No habrá intérpretes en todos los sitios de vacunación todo el tiempo. Si necesita un intérprete, asegúrese de decirles que es sordo y necesita un intérprete. En su lugar, pueden proporcionar interpretación por retransmisión de video (VRI) si no hay intérpretes disponibles.

Después de cada inyección, su brazo puede estar bastante adolorido durante unas horas o más. Si usa lenguaje de señas, aún debería poder hacerlo.

Si tiene preguntas, puede comunicarse con el Centro de Servicios SordoCiegos [DeafBlind Service Center](#).

Si vive en la región de Seattle y la Puget Sound también puede comunicarse con el Centro de Audición, Habla y Sordos [Hearing, Speech & Deaf Center](#).